



Nachsorgeempfehlung

Zu den Nachsorgeterminen in der Klinik für Tumororthopädie bitten wir die erforderliche Bildgebung auf CD mit schriftlichem Befund mitzuführen.

Chordom

Zeit (nach OP)	UK Essen	Heimatnah	Sacrum				Thorax ²	Abd.
			Röntgen	MRT	Röntgen	MRT		
Erstdiagnose	X					X	CT ^d	CT ^d
6 Monate	X					X	CT ¹	Sono
12 Monate	X					X	CT ¹	Sono
18 Monate		X				X	CT ¹	Sono
24 Monate	X					X	CT ¹	Sono
2,5 Jahre		X				X		
3 Jahre		X				X	CT ¹	Sono
3,5 Jahre		X				X		
4 Jahre		X				X	CT ¹	Sono
4,5 Jahre		X				X		
5 Jahre	X					X	CT ¹	Sono
6 Jahre		X				X		
7 Jahre		X				X	CT ¹	Sono
8 Jahre		X				X		
9 Jahre		X				X	CT ¹	Sono
10 Jahre	X					X		
¹ b. Neuauftreten v. Beschwerden	ggf.	X				X		

¹Nach definitiver Strahlentherapie Fortsetzung der Nachsorge alle 2-3 Jahre auch nach Ende des 10. Jahres. Nach R0 Resektion des Tumors ± adjuvanter Strahlentherapie Ende der regulären Nachsorge nach Ende des 10. Jahres.
²Bei Erstdiagnose diagnostisches CT (CT^d), danach low-dose Verlaufskontrollen (CT¹)

(NCCN Workup: Screening MRI of spinal axis; Surveillance: chest imaging every 6 months may include CT annually for 5 years, then annually thereafter; CT abdomen/pelvis annually)

Aktuell sind seitens der ESMO (European Society of Medical Oncology) und NCCN (National Comprehensive Cancer Network) Leitlinien zur onkologischen Nachsorge für Ihre Erkrankung festgelegt. Die vorstehenden Empfehlungen sind unter Anwendung größter Sorgfalt und Vorsicht aus dem Stand von Medizin und Forschung bei Drucklegung abgeleitet, deren Bestand jedoch wegen der ständigen Weiterentwicklung für die Zukunft nicht garantiert werden kann. Wenn Sie Veränderungen oder Auffälligkeiten bemerken, sollten Sie uns zu deren Abklärung sofort konsultieren.

Erstellt von: Dr. med. W. Guder	Freigegeben von: Prof. Dr. med. J. Harges, Prof. Dr. med. A. Streitbürger	Version 1.0 Gültig ab: 01.10.2020
---------------------------------	---	--------------------------------------