



**Nachsorgeempfehlung**

Zu den Nachsorgeterminen in der Klinik für Tumororthopädie bitten wir die erforderliche Bildgebung auf CD mit schriftlichem Befund mitzuführen.

**Adamantinom (klassisch, OFD-like)**

Zeit (nach OP)	UK Essen	Heimatnah	Extremitäten		Becken		Thorax
			Röntgen	MRT	Röntgen	MRT	
<b>Erstdiagnose</b>	X		X	X			<sup>1</sup> Rö/(low-dose) CT (nur klassisch)
<b>3 Monate</b>	X		X				
<b>6 Monate</b>		X	X				
<b>12 Monate</b>	X			X			<sup>1</sup> Rö/(low-dose) CT (nur klassisch)
<b>18 Monate</b>		X	X				
<b>24 Monate</b>	X			X			<sup>1</sup> Rö/(low-dose) CT (nur klassisch)
<b>3 Jahre</b>		X	X				
<b>4 Jahre</b>		X		X			
<b>5 Jahre</b>	X			X			<sup>1</sup> Rö/(low-dose) CT (nur klassisch)
<b>b. Neuauftreten v. Beschwerden</b>	ggf.	X	X	ggf.			

<sup>1</sup>Zeitpunkt und Häufigkeit der Anfertigung von Thorax-Untersuchungen in Absprache mit Patient als Einzelfallentscheidung.

Aktuell sind keine verbindlichen Leitlinien zur onkologischen Nachsorge für Ihre Erkrankung festgelegt. Die vorstehenden Empfehlungen sind unter Anwendung größter Sorgfalt und Vorsicht aus dem Stand von Medizin und Forschung bei Drucklegung abgeleitet, deren Bestand jedoch wegen der ständigen Weiterentwicklung für die Zukunft nicht garantiert werden kann. Wenn Sie Veränderungen oder Auffälligkeiten bemerken, sollten Sie uns zu deren Abklärung sofort konsultieren.