



Nachsorgeempfehlung

Zu den Nachsorgeterminen in der Klinik für Tumororthopädie bitten wir die erforderliche Bildgebung auf CD mit schriftlichem Befund mitzuführen.

Chondrosarkom (dedifferenziert) (Chemotherapie)

Zeit (nach OP)	UK Essen	Heimatnah	¹ Extremitäten		¹ Becken		Thorax	Abd.
			Röntgen	MRT	Röntgen	MRT		
Erstdiagnose	X		X	X	X	X	² n. Maßgabe der behandelnden Onkologie	
4 Monate	X		X			X		
8 Monate	X		X			X		
12 Monate	X		X			X		
16 Monate	X		X			X		
20 Monate	X		X			X		
24 Monate	X		X			X		
2,5 Jahre	X		X			X		
3 Jahre	X		X			X		
3,5 Jahre	X		X			X		
4 Jahre	X		X			X		
4,5 Jahre	X		X			X		
5 Jahre	X		X			X		
Jährlich (bis Ende 10. Jahr)	X		X			X		
Alle 2-3 Jahre oder b. Beschwerden	X		X			X		

¹Bei Implantation einer Tumorprothese erfolgt die Nachsorge primär mit Röntgen in 2 Ebenen; MRT nur bei Rezidivverdacht. ²oder wie Empfehlung Chondrosarkom G2-3 ohne Chemotherapie, wenn keine onkologische Empfehlung vorliegt.

(NCCN 2018: every 3 months yr 1+2, every 4 months yr 3, every 6 months yr 4+5, then yearly.)

Aktuell sind seitens der ESMO (European Society of Medical Oncology) und NCCN (National Comprehensive Cancer Network) Leitlinien zur onkologischen Nachsorge für Ihre Erkrankung festgelegt. Die vorstehenden Empfehlungen sind unter Anwendung größter Sorgfalt und Vorsicht aus dem Stand von Medizin und Forschung bei Drucklegung abgeleitet, deren Bestand jedoch wegen der ständigen Weiterentwicklung für die Zukunft nicht garantiert werden kann. Wenn Sie Veränderungen oder Auffälligkeiten bemerken, sollten Sie uns zu deren Abklärung sofort konsultieren.

Erstellt von: Dr. med. W. Guder	Freigegeben von: Prof. Dr. med. J. Harges, Prof. Dr. med. A. Streitbürger	Version 1.0 Gültig ab: 01.10.2020
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------